



Estradiol (idrar)

Gebelik dönemi boyunca idrarla atılan estriol miktarında progressif bir artış meydana gelir.

- (↑) 40. haftaya kadar progressif artış görülür.

Estradiol in pregnancy I. Radioimmunoassay for urinary estriol. Goebelsmann V, Therneycroft IH, Nakamura RM, Mishell DR Jr. Am J Obstet Gynecol 1972;112:802.

- (↑) 36. haftaya kadar progressif artış görülür. Bu haftadan sonra sabit kalır.

Inter- and intra-individual variations in reference values for hormone assays. Scholler R, Roger M, Avigdor R. In: Reference Values in Human Chemistry. Siest G (ed) Basel, Karger p:47, 1973.

- (↑) Gebelik döneminde idrarla atılan predominant östrojen estriol'dür. Düşen değerler, fetüsün risk altında olduğunu düşünür.

Handbook of Endocrine Tests in Adults and Children. Alsever RN, Gotlin RW. Chicago IL, Yearbook Medical Publishers 1978.

Bioscience Reports. Bioscience Laboratories. Van Nuys, CA 1980.

Blood thyroxine concentrations in lower birth weight infants. Dussault JH, Morisette J, Laberge C. Clin Chem 1979;25:2047-2049.